

Forums pour l'entourage

Sevrage Tramadol

Par Profil supprimé Posté le 16/03/2019 à 15h09

Bonjour à tous.

Je post ici pour avoir quelques conseils et avis. Mon conjoint est addict a l'Ixprim (tramadol/paracetamol) depuis des années. Tout a commencé avec un mal de dos, comme beaucoup de gens je crois. Il en prenait avant notre rencontre, au début de notre relation, il me disait que c'était pour le dos mais j'ai vite compris qu'il y avait un problème. Il fallait absolument en avoir d'avance pour ne pas tomber en panne !

C'est lorsque j'ai découvert qu'il faisait des fausses ordonnances que je lui en ai parlé et il m'a avoué qu'il était addict. Sa consommation a augmenté et il en est à 15 cachets par jour. 5 en 3 prises ou si il se lève tard, c'est 5 au lever et 10 le soir.

Il m'a dit qu'il voulait arrêter mais qu'il ne veut pas aller chez un médecin. Il est ok pour que je l'aide. Nous avons décidé de diminuer les doses plutôt que l'arrêt brutal. En effet, je l'ai retrouvé allongé au sol en sueur, tremblant avec d'horribles douleurs au ventre et dans tout le corps avec un diarrhée. Il n'avait pris aucun cachet depuis 24h.

Du coup c'est moi qui garde les boîtes et distribue.

Est-ce que passer à 3 prises de 3 comprimés au lieu de 5 n'est pas trop d'un coup ?

Je lui en ai donné 3 hier après sa crise, le soir je lui ai proposé encore 3 et il m'a avoué avoir retrouvé une boîte avec 4 cp et les avoir pris