

Forums pour les consommateurs

Passage du skenan au subutex

Par Profil supprimé Posté le 21/01/2020 à 11h58

Pour les initiés ou non, je souhaite switcher d'une parenthèse au skenan 200mg durant 13 jours, pour reprendre mon traitement sub. Ma dernière prise date d'hier matin à 8h45 puis plus rien sinon benzo. Je pensais être en chien ce matin, et là il est 13h et toujours rien pas de manque réel, sinon si j'y pense. Pensez-vous que je puisse passer au sub sans craindre un chien ++ ?
Merci pour vos réponses.

1 réponse

Moderateur - 21/01/2020 à 20h21

Bonjour Fredclo,

Passer d'un opiacé à l'autre est une opération délicate qui peut "précipiter" le manque ou au contraire vous exposer à un risque de surdose.

L'information à retenir et qui fonctionne dans tous les cas de passage d'un opiacé à un autre est d'attendre de ressentir les premiers signes de manque avant de consommer un nouveau produit.

Dans votre situation soyez particulièrement prudent car la consommation d'opiacé et de benzodiazépines vous expose à un risque élevé de surdose.

Consommer de la buprénorphine HD (Subutex ou autre) et des benzodiazépines est donc fortement déconseillé.

Bon courage

L'Equipe de modération