

Vos questions / nos réponses

Traiter la morphine pour compenser les douleurs d'une hernie discale

Par [Baptiste](#) Postée le 01/03/2021 01:54

Bonsoir, Ça va faire un mois tout juste que je prends de la morphine pour atténuer les douleurs de mon hernie discale sur l'étage L4-L5. À départ, j'avais commencé avec des médicaments plus légers mais qui se sont révélés inefficace pour stopper la douleur. Depuis une semaine, je vois les effets secondaires et le manque apparaître. J'ai eu ma première prise de panique vendredi soir. Et à présent je ressens le manque. Mon hernie discale risque de mettre du temps à se resorber. Que dois-je faire selon vous ? Si je diminue ou j'arrête, les douleurs risquent d'être insupportables. Si je continue, je risque d'être addict.

Mise en ligne le 01/03/2021

Bonjour,

Nous comprenons tout à fait que le sevrage de la morphine puisse être difficile à envisager. Il entraîne effectivement une période de sevrage d'une dizaine de jours dont les effets peuvent être très intenses surtout dans le cadre d'un arrêt brutal (douleurs musculaires, diarrhées, transpiration, etc). Lors d'une diminution progressive, les effets de manque sont plus atténués et donc peuvent être plus faciles à supporter.

Le mieux serait d'en discuter avec le médecin qui vous prescrit ces anti-douleurs afin de réfléchir avec lui à la possibilité d'une diminution échelonnée jusqu'à un arrêt total.

Durant toute la durée du sevrage/de la diminution, nous vous suggérons prendre des bains/douches bien chauds pour diminuer les effets du manque.

Bon courage à vous,
