

Tout savoir sur la cocaïne

Le dépistage de la cocaïne

Dépistage de la cocaïne : comment ça se passe ?

Le but du dépistage est de rechercher les traces de cocaïne dans l'organisme. Il permet aussi de rechercher la présence de crack et de free base.

[Lire la fiche Cocaïne du Dico des drogues](#)

[Lire la fiche Crack \(free base\) du Dico des drogues](#)

À noter : la cocaïne et le crack peuvent être recherchés dans le cadre d'un contrôle routier.

Les différentes techniques pour dépister la cocaïne

la cocaïne peut être dépistée sur un échantillon de salive, de sang ou d'urine

Pour les dépistages salivaires, sanguins ou urinaires, il y a 2 méthodes :

- **Les tests :** on met un réactif sur l'échantillon prélevé. Le résultat apparaît en quelques minutes. Il est soit positif, soit négatif.
- **Les analyses toxicologiques :** l'échantillon est envoyé dans un laboratoire d'analyse. Un résultat extrêmement précis est obtenu après quelques jours. Il indique la quantité de drogue présente dans l'échantillon.

À noter : dans certains cas (cas ou conditions ?), on recherche des traces de drogues dans les cheveux. C'est le test capillaire.

Les durées de positivité de la cocaïne

La « durée de positivité » est le temps pendant lequel on peut détecter les drogues dans le corps.

On ne peut pas connaître **de façon précise** la durée de positivité d'une drogue. Cela change en fonction de la personne, de la drogue, du dosage, de la fréquence et du mode de consommation (drogue fumée, injectée, etc.)

Voici quelques repères.

La cocaïne est dépistable :

dans la salive : pendant 24 heures, et jusqu'à 48h en cas d'usage régulier

dans le sang : pendant 24 heures

dans les urines :

pendant 2 à 4 jours en cas d'usage occasionnel (moins de 10 fois par an)

pendant 10 à 14 jours en cas d'usage intensif sur plusieurs mois (plusieurs consommations par jour, tous les jours).

À noter : Il peut arriver que le résultat d'un test soit positif alors que la personne n'a pas pris de cocaïne. C'est un faux positif. Mais cela se produit très rarement avec la cocaïne car la substance recherchée lors du dépistage, la benzoylecgonine est très spécifique à la cocaïne, au crack et au free base.

[Vos questions /Nos réponses sur le dépistage de la cocaïne](#)