Vos questions / nos réponses

Arrêt du Lysanxia

Par Profil supprimé Postée le 16/07/2011 06:13

> Après arrêt des benzodiazépines j'ai tjs des picotements brulures, douleurs musculaires et suées accompagnées de frissons. Je précise que j'ai diminué lentement à savoir en 12 mois. Est ce normale car à ce jour après arrêt (2 mois) j'ai des douleurs physiques horribles et insomnies ? Merci pour votre réponse. Comment faire pour être aider car j'ai des idée suicidaires, help, help , help.....

Mise en ligne le 18/07/2011

Bonjour,

Les symptômes que vous décrivez sont en effet ceux du sevrage aux benzodiazépines. Ces manifestations peuvent durer un certain temps après l'arrêt, d'autant plus si votre consommation a été importante et sur une longue période.

Toutefois, il est important de ne pas rester dans cet état et nous vous encourageons à consulter votre médecin prescripteur qui pourra certainement vous aider.

En cas d'impossibilité de le rencontrer, vous pouvez vous rendre à l'adresse indiquée ci-dessous. Vous pourrez y rencontrer un médecin spécialisé dans les addictions et la pharmacodépendance.

Vous souhaitant bon courage.

Cordialement.

Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec les structures suivantes :

CSAPA le Cèdre de l'Association CédrAgir

11 rue Eugène Varlin
59160 LOMME

Tél : 03 20 08 16 61
Site web : www.cedragir.fr
Secrétariat : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. Les après midi de 14h à 17h sauf le lundi 19h et le jeudi 18h.
Accueil du public : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. Les après-midi de 14h à 17h sauf le lundi 19h et le jeudi 18h
Substitution : Tous les matins (sauf le mercredi) de 8h30 à 10h30. Le lundi après-midi 17h-19h, le jeudi après-midi de 16h-18h.

Voir la fiche détaillée